



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

| Grupos Prioritários | Quantitativo | Dose 1 | Dose 2 | Dose 3 | Única | Dose Adicional | Reforço |
|---|--------------|--------|--------|--------|-------|----------------|---------|
| Trabalhadores de Saúde | 78 | 79 | 79 | | 00 | | |
| Trabalhadores de Força de Segurança e Salvamento | 05 | 05 | 05 | | 00 | | |
| Comorbidades | 215 | 209 | 202 | | 00 | 21 | |
| Trabalhadores Educacionais | 47 | 50 | 51 | | 01 | | |
| Pessoas com deficiência | 15 | 16 | 17 | | 00 | | |
| Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário e Caminhoneiros | 76 | 78 | 79 | | 00 | | |
| Puérperas | 03 | 05 | 05 | | 00 | | |
| Gestantes | 10 | 06 | 06 | | 00 | | |
| Pessoas de 18 e mais | 1672 | 1667 | 1703 | | 59 | | |
| Pessoas de 06 meses a 17 anos | 463 | 481 | 421 | | 00 | | |
| Reforço de Pessoas de 06 meses e mais | | | | | | | 3428 |
| Reforço de Pessoas de 12 anos e mais da Vacina Bivalente | | | | | | | 884 |

Dados fornecidos pela 12ª Coordenadoria Regional de Saúde.

ATENÇÃO PARA GRUPOS DE VACINAÇÃO NO MOMENTO

Profissionais da Saúde

Pessoas com Comorbidades

Forças de Segurança e Salvamento

Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros

Caminhoneiros

Gestantes e puérperas

Adolescentes com Comorbidades

Lactantes

Pessoas acima de 03 anos recebem a Primeira Dose e a Segunda Dose (intervalo mínimo entre a Primeira e a Segunda Dose é de oito semanas ou 28 dias conforme o Laboratório da Vacina)

Pessoas acima de 12 anos recebem a Terceira Dose (intervalo mínimo entre a Segunda e a Terceira Dose é de quatro meses)

Pacientes entre 18 anos e 39 anos de idade com Comorbidade, recebem a Segunda Dose de Reforço (Quarta Dose) com intervalo mínimo de 4 meses a partir do Primeiro Reforço (Terceira Dose)

Pessoas com 40 anos de idade ou mais, recebem a Segunda Dose de Reforço (Quarta Dose) com intervalo mínimo de 4 meses a partir do Primeiro Reforço (Terceira Dose)

Imunossuprimidos (intervalo mínimo entre a Segunda Dose e a Dose Adicional é de oito semanas, o intervalo entre a Dose Adicional e a Dose de Reforço é de quatro meses, o intervalo entre a Dose de Reforço e o Segundo Reforço é de 4 meses)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

Trabalhadores da Saúde recebem a Segunda Dose de Reforço (Quarta Dose) com intervalo mínimo de 4 meses a partir do Primeiro Reforço (Terceira Dose).

-Reforço (3ª dose) para crianças de 5 a 11 anos (intervalo mínimo entre a Segunda e a Terceira Dose é de quatro meses).

-Reforço Covid 19 Vacina Bivalente para grupos prioritários para pessoas de 12 anos ou mais (intervalo mínimo entre o esquema primário e o reforço é de quatro meses).

-Crianças de 6 meses a 4 anos recebem a Primeira Dose, Segunda Dose e Terceira dose da vacina Pfizer Baby (intervalo mínimo entre a Primeira e a Segunda Dose é de 4 semanas e o intervalo mínimo entre a Segunda Dose e a Terceira Dose é de 8 semanas).

-Reforço para crianças de 3 a 4 anos (intervalo mínimo entre a Segunda e a Terceira Dose é de quatro meses).

Atualização 31 de Maio de 2024