



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

Grupos Prioritários	Quantitativo	Dose 1	Dose 2	Dose 3	Única	Dose Adicional	Reforço
Trabalhadores de Saúde	78	79	79		00		
Trabalhadores de Força de Segurança e Salvamento	05	05	05		00		
Comorbidades	215	209	202		00	21	
Trabalhadores Educacionais	47	50	51		01		
Pessoas com deficiência	15	16	17		00		
Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário e Caminhoneiros	76	78	79		00		
Puérperas	03	05	05		00		
Gestantes	10	06	06		00		
Pessoas de 18 e mais	1672	1667	1703		59		
Pessoas de 03 a 17 anos	463	436	393		00		
Reforço de Pessoas de 12 anos e mais							3342
Reforço de Pessoas de 5 A 11 anos							39
Crianças de 6 meses a 4 anos		33	19	24			
Reforço de Pessoas de 12 anos e mais da Vacina Bivalente							650
Reforço crianças 3 a 4 anos							05

Dados fornecidos pela 12^a Coordenadoria Regional de Saúde.

ATENÇÃO PARA GRUPOS DE VACINAÇÃO NO MOMENTO

Profissionais da Saúde

Pessoas com Comorbidades

Forças de Segurança e Salvamento

Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros

Caminhoneiros

Gestantes e puérperas

Adolescentes com Comorbidades

Lactantes

Pessoas acima de 03 anos recebem a Primeira Dose e a Segunda Dose (intervalo mínimo entre a Primeira e a Segunda Dose é de oito semanas ou 28 dias conforme o Laboratório da Vacina)

Pessoas acima de 12 anos recebem a Terceira Dose (intervalo mínimo entre a Segunda e a Terceira Dose é de quatro meses)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

Pacientes entre 18 anos e 39 anos de idade com Comorbidade, recebem a Segunda Dose de Reforço (Quarta Dose) com intervalo mínimo de 4 meses a partir do Primeiro Reforço (Terceira Dose)

Pessoas com 40 anos de idade ou mais, recebem a Segunda Dose de Reforço (Quarta Dose) com intervalo mínimo de 4 meses a partir do Primeiro Reforço (Terceira Dose)

Imunossuprimidos (intervalo mínimo entre a Segunda Dose e a Dose Adicional é de oito semanas, o intervalo entre a Dose Adicional e a Dose de Reforço é de quatro meses, o intervalo entre a Dose de Reforço e o Segundo Reforço é de 4 meses)

Trabalhadores da Saúde recebem a Segunda Dose de Reforço (Quarta Dose) com intervalo mínimo de 4 meses a partir do Primeiro Reforço (Terceira Dose).

-Reforço (3ª dose) para crianças de 5 a 11 anos (intervalo mínimo entre a Segunda e a Terceira Dose é de quatro meses).

-Reforço Covid 19 Vacina Bivalente para grupos prioritários para pessoas de 12 anos ou mais (intervalo mínimo entre o esquema primário e o reforço é de quatro meses).

-Crianças de 6 meses a 4 anos recebem a Primeira Dose, Segunda Dose e Terceira dose da vacina Pfizer Baby (intervalo mínimo entre a Primeira e a Segunda Dose é de 4 semanas e o intervalo mínimo entre a Segunda Dose e a Terceira Dose é de 8 semanas.

-Reforço para crianças de 3 a 4 anos (intervalo mínimo entre a Segunda e a Terceira Dose é de quatro meses).

Atualização 10 de Novembro de 2023